



## HYKS Naistentaudit ja synnytykset

### *Traneksaamihapon käyttö keisarileikkauksissa*

Seuraavien riskiryhmien synnyttäjille annetaan aina ennen elektiivistä, kiireellistä tai hätäkeisarileikkausta traneksaamihappoa.

Annos on 1 g IV ennen ihoviiltoa (hätäsektiossa heti kun mahdollista).

Lääke annetaan:

- hitaana injektiona laskimoon (valmistajan ohje 1 ml/min)
- tai infuusiona (1 g / NaCl 0.9 % 100 ml) n. 10 minuutissa

Riskiryhmiin kuuluvat synnyttäjät:

- aiempi synnytyksen jälkeinen verenvuoto (> 1000 ml)
- istukan kiinnittymishäiriöt (praevia, accreta, increta, percreta)
- multipariteetti ( $\geq 4$  aiempaa synnytystä)
- monisikiöinen raskaus
- trombosytopenia (B-tromb < 150)
- anemia (Hb < 100)
- infektio (korioamnioniitti, kuume  $\geq 38$ )
- von Willebrandin tauti, hemofilian kantaja tai muu vuotohäiriö
- verensiirroista kieltäytyjä

Muiden synnyttäjien osalta voimassa on aiempi käytäntö:

Traneksaamihappoa annetaan 1 g IV,

- jos verenvuoto keisarileikkauksessa  $\geq 500$  ml
- annos uusitaan kaikille, jos verenvuoto  $\geq 1500$  ml.